

Magnicur Core

Před použitím si přečtěte příložený návod k použití.

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG). K ochraně jabloně, révy vinné a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.

Název a množství účinné látky: **trifloxystrobin 500 g/kg (50% hmot.).**

Varování

- H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P280: Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
- P333+P313: Při PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE NEBO VYRÁŽČCE: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P501: Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
- SP1: Neznečišťujte vodu přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikací zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabráňte kontaminaci vod splachem z řasem a z cest).
- SPe3: Za účelem ochranných opatření snížit účinek dodržet podmínky ochranných opatření z pohledem k povrchové vodě. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.
- SPe5: Před opětovným vstupem ošetřené prostory/sklenky/důlkhadně vyvětrejte.
- EUH 401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Před použitím si přečtěte příložený návod k použití.



Dízeň provedení: SBM Développement S.A.S., 60 Chemin des Mouilles, 691 30 Ecully, France
Právní zastupce: SBM Life Science s.r.o., Buchatova 2657/112, 158 00 Praha 5, tel: 226 226 346
 Osoba odpovědná za konečné balení a označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: LOVELLA Terezín s.r.o., Budíněk 86, 263 01 Svate Pole

Evidenční číslo přípravku: 4403-1-2

Datum výroby uvedeno na krabici a číslo šarže na sáčku výrobku
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při dodržení stanovených podmínek skladování v neporušených obalech (teplota skladování: +5 °C až +30 °C)

Množství přípravku v obalu: 1,5g, 15g až 100g PET/Al/PE sáček

Způsob působení:

Magnicur Core je fungicid ze skupiny strobilurinu. Vlivem pohybu par dochází k dobrému rozpuštění a ukládání přípravku na rostlinném povrchu. Trifloxystrobin zabírá klíční spor a řáso mycelia hub na povrchu rostlin. Inhibuje také vývoj patogenů v povrchových vrstvách rostlinných tkání.

Návod k použití / rozsah povoleného použití:

Jednotlivcová balení:

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiny účel použití	Dávkování, místelnost	Ochr. lhůta (dny)	Poznámka
Jablň	strupovitost jabloně, padlí jablotové	(1,5g/10 l vody)	14	4) do počátku skautní
Réva	padlí révové	(0,0125-0,015%) (1,25-1,5g/10 l vody)	35	4) do počátku skautní

Dělitelná balení:

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiny účel použití	Dávkování, místelnost	Ochr. lhůta (dny)	Poznámka
Jablň	strupovitost jabloně, padlí jablotové	(1,5g/10 l vody)	14	4) do počátku skautní
Réva	padlí révové	(0,0125-0,015%) (1,25-1,5g/10 l vody)	35	4) do počátku skautní

Ol. (ochranná lhůta) je dána počtem dní, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
Jablň, réva	Postřik, rosení	3x/rok	10 dní

Menšíkové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení ES

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiny účel použití	Dávkování, místelnost	Ochr. lhůta (dny)	Poznámka	
				2) k škodl. organismu	4) k dávkování 5) k umístění
Okrasné rostliny	skvrnitost listů, padlí, rzi	0,015% (1,5g/10 l vody)	2)	2) preventivně, při prvním výskytu	4) do počátku skautní 5) venkovní prostory, skleníky

(-) ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
Okrasné rostliny	Postřik, rosení	3x/rok	10 dní

Upřesnění použití:

Důležitá a odlišná činnost: není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na malém vzorku rostlin v daných podmínkách.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na zdraví lidí, nechtělých organismů a složek životního prostředí:

Při aplikaci na ovocné stromy: Spe3: Za účelem ochrany vodních organismů snížit účel dodržet podmínky ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Riziko, které představuje přípravku pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Učesané trsyky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Vstup na ošetřené pozemek je možný až druhý den po aplikaci.

Při přípravě aplikací kapalinu ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čochy.

Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby. Práce s přípravkem je nevhodná pro těhotné a kojící ženy a mladistvé.

Příprava aplikací kapalin:

Uvedeno v kapitole „Další údaje a upřesnění“.

Čištění aplikacního zařízení:

Uvedeno v kapitole „Další údaje a upřesnění“.

Osobní ochranné pracovní prostředky - osobní pracovní prostředky při přípravě a aplikaci:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice

Ochrana těla: ochranný oděv a nepromokavý plášť nebo turistická pláštěnka

Dodatečná ochrana hlavy: kapuce, čepice se šitkem nebo klobouk v případě ručního postřiku - ve výšce obličejové nebo směrem nahoru

Ochrana očí a obličej: při aplikaci postřikem směrem dolů není nutná, ochranné brýle nebo obličejový štít v případě ručního postřiku - ve výšce obličejové nebo směrem nahoru

Pokozžené ochranné prostředky (např. nepromokavé rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Informace o první pomoci:

Výslobné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (podráždění kůže nebo podráždění na alergickou reakci) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku, přílohoého letáku nebo bezpečnostního listu.

Při nadychnutí aerosolu při aplikaci: Převraťte práci. Převraťte mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid.

Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte důkladně pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.

Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čochy, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách velkým množstvím vlahe tekoucí čisté vody. Kontaktní čochy nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.

Při nahodném požití: Ústa vyplachujte vodou, nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařské pomoci informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informacním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování:

Skladujte v originálních neporušených obalech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách +5°C až +30°C. Charaňte před prvním slunečním svitem a vlhkem.

Další údaje a upřesnění:

Balí a dodává: LOVELLA Terezín s.r.o., provozovna: 28. října 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224

Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvadlet na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovědného vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratorně akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodávacím dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.

Technika aplikace: Přípravek Magnicur Core se aplikuje postřikovací, případně rosičí. Při aplikaci je nutné použít dostatečné množství aplikací kapalinu, aby byla dosažena rovnoměrná pokrývnost, nesmí však dojít ke škápnutí přípravku z povrchu ošetřených rostlin (do počátku skautní). Vyšší dávky aplikací kapalinu jsou vhodné pro ošetření hustších porostů, resp. s velkou plochou zelené hmoty.

Upozornění: Ošetřovaný porost nesmí být v době aplikace vlhký v důsledku rosy nebo předchozích dešťových srážek. Během 2 hodin po aplikaci by nemělo pršet. Nedoporučujeme aplikovat v poledne v době nejintenzivnějšího slunečního svitu a vysokých teplot. Aplikace nesmí zasahovat sousední neochráněné porosty!

Příprava aplikací kapalin: Odměrnou dávku přípravku vsypete do nádže postřikovače předem naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený objem. Přípravek postřikovací kapalinu bezodkladně sporteovat.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravku: Postřikovače po aplikaci důkladně vyplachujte vodou (3x) a vyplachovou kapalinu poté vystrkujte na nepoškoděný ošetřovaný plodinu.

Dodatečné informace společnosti SBM Développement S.A.S.:

Jablň - skládkové choroby: Aplikace v období po ukončení kvetení omezuje výskyt skládkových chorob, zejména hrdě krmňové hnitoby (Rezulca spp.). Pozdní aplikace (28 dní až 14 dní před sklizní) jsou účinné proti skládkovým chorobám, zejména skládkové strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis), hrdě krmňové (Rezulca spp.) a pemlicňové (Penttilium spp.) hnilobě plodu.

Réva vinná - černá hniloba, červená spála, plísňová réva, černá skvrnitost, šedá hniloba, bílá hniloba. Dle zkušenosti společnosti SBM Développement S.A.S. přípravek Magnicur Core v dávce 0,015 % současně působí i proti černé hnilobě a červené spále révy vinné a má také podstatnou vedlejší účinnost proti plísni révové, černé skvrnitosti, šedé hnilobě a bílé hnilobě.

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití. Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti SBM Développement S.A.S., platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin.

V případě použití jakékoli kombinace předem odkoušeňte vzájemnou místelnost jednotlivých zamýšlených složek.

Společnost SBM Développement S.A.S. nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.